

Отнимаются задние лапы у кошки: что делать

Если кошка вдруг перестаёт вставать на задние лапы, важно сразу оценить ситуацию. Такой симптом может быть связан с травмой, сосудистой катастрофой, неврологической проблемой или сильной болью. Чем быстрее питомец попадёт к врачу, тем выше шанс вернуть опору на лапы и избежать тяжёлых последствий.

Слабость задних конечностей у кошки может развиваться внезапно или усиливаться день ото дня. Хозяину важно не пытаться ставить диагноз самостоятельно и не давать человеческие обезболивающие. В этой статье разберём вероятные причины, признаки, первичную помощь дома и принципы лечения.

Как это выглядит

Отказ задних лап — это не самостоятельный диагноз, а признак целого ряда состояний. Кошка может волочить лапы, падать на бок, не наступать на лапу или полностью лежать. Иногда страдает только одна лапа, иногда — обе сразу.

- Внезапная слабость и шаткость походки
- Подволакивание лап, походка на запястьях
- Крен тела в одну сторону
- Реакция боли на прикосновение
- Задержка мочи

Важно различать ситуации, когда животное не встаёт на задние лапы и дышит тяжело. Такая комбинация бывает признаком болевого шока или сосудистой катастрофы, поэтому нельзя ждать. Когда причина в сосудах или сердце, помощь нужна в течение ближайших часов.

Возможные причины

Причины разнообразны, и точный диагноз ставит специалист. Ниже перечислены состояния, которые чаще всего рассматривают на приёме.

- Повреждение при падении, ударе или драке
- Острое нарушение кровотока в сосудах
- Патология спинного мозга или нервных стволов
- Выраженный болевой синдром
- Нарушения обмена веществ
- Инфекция или воспаление

Порой слабость задних конечностей объясняют возрастом. Действительно, у пожилых кошек бывают дегенеративные изменения, но внезапный отказ лап не считается нормальным признаком старения. Также учитывают породную предрасположенность, например у вислоухих кошек.

Первая помощь дома

Пока едет врач, главное — безопасность и спокойствие. Не вправляйте конечности, не растирайте позвоночник и не делайте инъекции. Не применяйте человеческие обезболивающие: это может скрыть

симптомы и навредить.

- Уложите кошку на ровную поверхность
- Оградите от других животных и детей
- Не поднимайте за передние лапы и не тяните за хвост
- Согрейте и не кормите через силу
- Запишите, что случилось и когда

Для перевозки лучше использовать жёсткую переноску или [Нажмите, чтобы узнать больше](#) коробку. При подозрении на травму позвоночника фиксируйте тело максимально ровно. Если есть задержка мочи, это отдельный повод торопиться.

Диагностика

На приёме сначала собирают анамнез и осматривают питомца. Специалист оценивает чувствительность, рефлексы, пульс, температуру и болевую реакцию. Затем назначают обследования для уточнения причины.

- Рентген для оценки костей и суставов
- УЗИ для оценки внутренних органов и сосудов
- Анализы крови и мочи для оценки общего состояния
- ЭКГ, если есть подозрение на проблему с сердцем
- Неврологическое обследование спинного мозга

Объём диагностики зависит от тяжести. Часть процедур возможна на дому, часть требует клиники. Не откладывайте диагностику, если лапы отнялись внезапно.

Как лечат

Терапию подбирают по причине. При травме может понадобиться операция и иммобилизация. При сосудистом нарушении важна экстренная помощь. При неврологических причинах используют препараты и восстановление.

Ситуация	Подход	На что направлено	Повреждение	Стабилизация, обезболивание, при необходимости операция
Восстановить опору и снять боль	Сосудистое нарушение	Экстренная госпитализация и поддержка кровотока	Сохранить жизненно важные функции	Неврологическая причина
Медикаменты, физиотерапия, уход	Постепенно вернуть подвижность	Боль	Обезболивание по назначению	Обеспечить комфорт и покой

Дома нужно точно выполнять рекомендации. Не давайте дополнительные лекарства без согласования. Если состояние ухудшается, сообщите врачу.

Красные флаги

Есть признаки, при которых помощь нужна немедленно. Отказ задних лап сам по себе — серьёзный повод. Особенно при резком начале.

- Тяжёлое дыхание или посинение слизистых
- Судороги, обморок
- Неостанавливающееся кровотечение

- Отсутствие мочеиспускания
- Резкая боль и крик

Когда животное не встаёт и тяжело дышит, не ждите планового приёма. Раннее обращение повышает шансы.

Реабилитация

Восстановление может занять время. Нужны покой, мягкая подстилка и доступ к воде. Если кошка не может ходить, следите за гигиеной.

- Не заставляйте вставать через силу
- Переносите на ровной поверхности
- Следите за кожей и шерстью
- При задержке мочи сразу связывайтесь с врачом
- Выполняйте назначения и приходите на контроль

Не наносите согревающие средства на позвоночник. Не давайте препараты без назначения. Прогноз зависит от причины и скорости обращения.

Профилактика

Полностью исключить все причины нельзя. Но часть рисков снижают простые меры. Плановые осмотры помогают выявить проблему раньше.

- Держите окна и балконы безопасными
- Убирайте токсичные вещества и растения
- Следите за весом и активностью
- При травме сразу обращайтесь к врачу
- Регулярно посещайте врача

При хронических болезнях, следуйте плану лечения. Это уменьшает риск обострений.

Заключение

Отказ задних лап у кошки — это сигнал, который требует быстрой оценки. Причины варьируются от повреждения до сосудистых и неврологических нарушений. Не лечите самостоятельно и не откладывайте визит к специалисту.

Чем раньше начать диагностику и лечение, тем выше шансы на восстановление. Следуйте назначениям врача и обеспечивайте питомцу покой и уход. При ухудшении сразу обращайтесь за помощью.

Часто задаваемые вопросы

Почему у кошки отнимаются задние лапы?

Причины разные: травма, сосудистая проблема, неврологическое нарушение, сильная боль, обменные или инфекционные процессы. Точную причину устанавливает специалист после осмотра и диагностики.

Что делать до приезда врача?

Обеспечьте покой и ровную поверхность. Не вправляйте лапы, не растирайте позвоночник, не применяйте человеческие препараты. Соберите сведения о произошедшем и дождитесь врача.

Когда обращаться немедленно?

Если есть тяжёлое дыхание, судороги, потеря сознания, кровотечение, отсутствие мочеиспускания или резкая боль. В таких ситуациях нельзя ждать.

Как врач определяет причину?

Осматривают, проверяют рефлексы и чувствительность. По показаниям назначают рентген, УЗИ, анализы, ЭКГ и неврологический осмотр. Одни процедуры делают на дому, другие — в клинике.

Можно ли давать обезболивающее?

Без назначения врача — нельзя. Человеческие препараты могут навредить и исказить картину. Обезболивание подбирает только специалист.

Вернётся ли подвижность?

Прогноз зависит от причины и скорости обращения. Ранняя диагностика и лечение повышают шансы. Дальнейшие рекомендации даёт лечащий врач.