

Кровь в моче у кота: почему это опасно и что делать

Кровь в моче у кота — это симптом, требующий внимательного отношения и быстрой реакции. Моча с кровью может выглядеть как розовая, красная или коричневая, а иногда кровь заметна только на стенках лотка или **Перейдите сюда** в виде отдельных капель.

Нужно осознавать, что данный признак сигнализирует о сбое в мочеполовой системе, почках либо иных внутренних органах. Оперативное обращение к специалисту увеличивает шансы на благополучный исход и снижает риск тяжёлых осложнений. Ниже рассмотрим вероятные причины, признаки и последовательность шагов.

Причины крови в моче у кота

Примесь крови в моче у кота возникает по разным причинам — от малозначимых до крайне опасных. Нередко виновником становится мочекаменная болезнь: конкременты и песок ранят слизистую мочевого пузыря и уретры.

Цистит — воспалительный процесс в мочевом пузыре — нередко сопровождается кровью и болезненными мочеиспусканиями. Инфекции, вызванные бактериями или микоплазмами, раздражают слизистую и могут давать примесь крови.

Травмы, падения, удары или случайное попадание инородного тела в уретру — ещё одна возможная причина. В зрелом возрасте у кошек нередко выявляют опухоли либо полипы в мочевыводящей системе.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Помимо крови в моче, у кота могут быть и другие тревожные признаки. Заметьте, если животное часто бежит к лотку, сидит там с напряжением и мяукает от боли во время мочеиспускания.

- Постоянные позывы, однако моча отделяется малыми порциями либо не отходит совсем.
- Питомец тревожен, вылизывает промежность, не даёт дотронуться до живота.
- Моча имеет резкий, неприятный запах или необычный цвет.
- Потеря аппетита, апатия, подъём температуры тела.
- В некоторых случаях возникает рвота, понос или иные признаки недомогания.

Если кот не может помочиться в течение суток или более, это критическое состояние, требующее немедленной помощи. Непроходимость уретры у котов ведёт к интоксикации и способна убить животное в течение 1–2 суток.

Первая помощь дома

Увидев кровь в моче, не пытайтесь справиться своими силами и не используйте человеческие медикаменты. Ряд средств, таких как парацетамол или ибупрофен, опасны для кошек и способны ухудшить ситуацию.

1. Обеспечьте питомцу покой и доступ к свежей воде.
2. Исключите из питания продукты, раздражающие мочевыделительную систему, — солёное, острое.
3. Соберите мочу для анализа: чистый лоток или стерильная ёмкость помогут получить образец.

4. Позвоните в ветклинику или в скорую помощь, расскажите о признаках.
5. Придерживайтесь советов доктора до очного осмотра.

Диагностика в клинике

В ветеринарной клинике для выяснения причины крови в моче проводят комплексное обследование. Чаще всего стартуют с общего анализа урины, определяющего красные и белые клетки, соли и бактерии.

- Общеклинический и биохимический анализ крови для проверки почек и организма в целом.
- УЗИ органов брюшины и почек позволяет обнаружить конкременты, опухоли, воспалительные изменения.
- Рентген для обнаружения рентгеноконтрастных камней.
- Посев мочи на бактериальную флору и определение чувствительности к антибиотикам.
- В трудных ситуациях прибегают к цистоскопии или эндоскопии.

Что может скрываться за симптомом

Гематурия нередко сопутствует идиопатическому циститу, мочекаменной болезни, инфекциям мочевых путей. У кошек нередко выявляют микоплазмоз, способный провоцировать появление крови в урине.

ПатологияТипичные симптомыВоспаление мочевого пузыряЧастое болезненное мочеиспускание, кровь в мочеМочекаменная болезньКонкременты и песок, блокировка уретры, кровьИнфекции мочевыводящих путейБактерии или микоплазмы, воспаление, кровьНовообразованияМедленное усиление признаков, кровьТравмыРезкое начало после падения или ушиба

Как помочь питомцу

Лечение напрямую зависит от установленной причины. При инфекциях назначают антибиотики, при камнях — специальную диету, растворяющую камни, или хирургическое вмешательство.

В тяжёлых случаях, например при полной закупорке уретры, может потребоваться катетеризация и стационарное лечение. При раннем визите к врачу прогноз часто благоприятный; запоздалая помощь грозит хронической почечной недостаточностью. По завершении лечения важно поддерживать диету, контролировать потребление воды и проходить плановые осмотры.

Заключение

Кровь в моче у кота — опасный симптом, игнорировать который недопустимо. Ранняя диагностика и адекватная терапия позволяют быстро справиться с недугом и восстановить самочувствие любимца.

Не занимайтесь самолечением и не ждите, что «само пройдет». Заметив первые тревожные signs, обратитесь к ветврачу — это убережёт здоровье и жизнь вашего любимца.

Часто задаваемые вопросы

Проходит ли гематурия самостоятельно

Хотя иногда признаки на короткое время утихают, основное заболевание никуда не девается, и без помощи врача вероятны обострения и осложнения.

Опасно ли это для человека

Сама гематурия не заразна, но некоторые её причины, например микоплазмоз, [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) могут быть потенциально опасны для людей с ослабленным иммунитетом, поэтому важна гигиена и консультация врача.

Отсутствие мочеиспускания у кота — что делать

Это неотложное состояние: срочно везите питомца в круглосуточную клинику или вызывайте ветеринара на дом. Закупорка уретры может убить кота за 1–2 дня.

Можно ли дать коту активированный уголь при подозрении на отравление

Активированный уголь иногда используют при отравлениях, но он не является специфическим антидотом и может не помочь при гематурии. Давать любые препараты без назначения ветеринара не рекомендуется, так как это может смазать картину и навредить.

Как собрать мочу у кота для анализа

Примените чистый лоток без наполнителя или стерильный контейнер. Если питомец ходит мимо, подстелите чистую плёнку либо подставьте одноразовую посуду. Доставьте образец в ветклинику в течение одного-двух часов.

Помогает ли диета при гематурии

Схему питания определяет ветврач по результатам диагностики. При камнях назначают специальные корма, растворяющие определённый вид конкрементов, при воспалении — мягкую диету с высоким содержанием влаги. Не корректируйте рацион самостоятельно.