

Кот заваливается на задние лапы: что делать

Когда кот внезапно перестаёт опираться на задние лапы, медлить нельзя. Этот симптом встречается при разных заболеваниях — от повреждения позвоночника до проблем с сосудами и нервами. Следует срочно обратиться за ветеринарной помощью, так как часть причин опасна для жизни в короткие сроки.

Ниже мы рассмотрим, почему у кота отказывают задние лапы, на что обратить внимание в состоянии питомца, и как правильно действовать до осмотра врачом. Материал подходит для владельцев взрослых кошек и котят, но решение о лечении принимает ветеринарный врач.

Основные причины слабости задних конечностей

Нормальная опора на задние лапы зависит от нервной системы, кровоснабжения, мышц и костей. Сбой в одном из звеньев проявляется шаткостью, дрожью или неспособностью встать. Для владельца важно понять, как именно развивался симптом: резко или нарастающе. Это помогает ветеринару сузить круг возможных причин.

- Травмы: падение с высоты, удар, неудачный прыжок
- Проблемы с сосудами, в том числе закупорка тромбом
- Патологии нервов и спинного мозга
- Инфекции и интоксикации
- Метаболические расстройства и нехватка нутриентов
- Опухолевые процессы
- Острая боль в суставах или позвоночнике

Некоторые состояния угрожают жизни уже в первые часы. К ним относят тромбоз, тяжёлую травму, отравление и острое нарушение кровоснабжения. Здесь недопустимо выжидать: помощь нужна как можно раньше. Чем быстрее питомец попадёт к специалисту, тем выше шансы на восстановление.

Тревожные симптомы при слабости задних лап

Помимо того, что кот заваливается, нужно оценить его общее самочувствие. Посмотрите, как дышит кошка: поверхностное, шумное или с усилием. Осмотрите дёсны и язык: бледность, синева или серость требуют немедленной помощи. Также важны: телесная температура, болезненная реакция, поведение при пальпации.

- Полная обездвиженность задних лап
- Выраженный болевой синдром: крик, агрессия при касании
- Нарушение мочеиспускания или дефекации
- Потеря чувствительности в лапах и хвосте
- Судороги, подёргивания, потеря сознания
- Апатия, отказ от корма и питья

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, не пытайтесь лечить кота самостоятельно. Ряд человеческих препаратов токсичен для кошек. Лучшее, что можно сделать, — обеспечить покой и связаться с ветеринаром. При подозрении на травму не перемещайте животное без нужды.

Что делать до приезда ветеринара

Пока едет врач, постарайтесь не паниковать. Спокойное поведение владельца снижает стресс питомца. Организуйте тихое безопасное пространство: удобное место без сквозняков и посторонних животных. Не применяйте препараты без назначения врача.

1. Посмотрите на дыхание и слизистые
2. Зафиксируйте, когда появились признаки и что им предшествовало: травма, токсин, укус
3. Подготовьте переноску с мягким дном и обеспечьте доступ воздуха
4. Свяжитесь с ветеринарной службой и опишите состояние питомца
5. Следуйте указаниям оператора до приезда врача

Не пробуйте вправлять конечности и не давайте анальгетики без назначения. Подобные меры могут навредить [прием специалиста-ветеринара](#) и замаскировать признаки. Если кот в сознании и не проявляет агрессии, можно аккуратно переложить его на подстилку. Если есть подозрение на повреждение позвоночника, лучше не перемещать питомца.

Как ветеринар ставит диагноз

Диагностика начинается с осмотра и сбора анамнеза. Доктор исследует рефлексы, ощущения, напряжение мышц и болевой ответ. Дополнительно применяют: рентген, УЗИ, анализы крови и мочи. При неясной картине выполняют МРТ или КТ. От точного диагноза зависит выбор лечения.

ИсследованиеЧто показываетКлинический осмотрРефлексы, боль, тонусРентгенографияСтруктуру костей, суставов, позвонковУльтразвуковое исследованиеСостояние органов и сосудовАнализ крови и мочиИнфекции, обмен, токсиныМРТ либо КТСостояние нервной системы и опухоли

Не откладывайте диагностику, если состояние ухудшается. Ранняя диагностика помогает вовремя приступить к терапии. Ряд болезней нуждается в экстренной помощи.

Подходы к терапии

Терапия подбирается в зависимости от причины слабости задних конечностей. При повреждениях возможны фиксация или хирургическое вмешательство. При сосудистых проблемах назначают лекарственную поддержку. Инфекции и отравления требуют специфического лечения и инфузий. Восстановительный период может включать реабилитацию.

- Медикаментозная поддержка: обезболивание, противовоспалительные, сосудистые средства
- Инфузии для снятия интоксикации и поддержания организма
- Хирургия при травмах, грыжах, опухолях
- Антибиотики или противовирусные препараты при инфекциях
- Физиотерапия и ЛФК на этапе реабилитации
- Налаживание рациона и витамины

Никакой способ лечения не следует выбирать без диагноза. Неправильная терапия может навредить или отсрочить выздоровление. Выполняйте назначения специалиста и не изменяйте их без согласования.

Что влияет на прогноз

На прогноз влияют причина, быстрота обращения и здоровье кота в целом. Раннее обращение повышает вероятность восстановления. Некоторые болезни требуют долгого восстановительного периода. Меры профилактики: безопасное пространство, плановые осмотры, контроль хронических болезней.

- Устраните опасности и защитите окна и балконы
- Проходите профилактические осмотры у ветеринара
- Контролируйте рацион и вес
- Вакцинируйте и обрабатывайте от паразитов по схеме врача
- Обращайте внимание на ранние изменения поведения и подвижности

Если кот перенёс эпизод слабости задних лап, важно наблюдаться у ветеринара и после улучшения. Некоторые заболевания склонны к рецидивам. Выполнение советов врача уменьшает вероятность повторения.

Заключение

Слабость или отказ задних лап у кота — это не самостоятельный диагноз, а симптом. Причины могут быть разными: от травмы и тромбоза до инфекций и обменных нарушений. Своевременный визит к врачу улучшает прогноз.

Часто задаваемые вопросы

Почему кот не может встать на задние лапы

Факторов немало: травмы, сосудистые нарушения, неврологические болезни, инфекции, отравления, обменные проблемы. Установить точную причину может только ветеринар после обследования.

Как действовать при слабости задних лап

Создайте спокойную обстановку, не применяйте препараты самостоятельно и сразу обратитесь к врачу. Расскажите оператору о симптомах и выполняйте его советы. Не пробуйте самостоятельно вправлять лапы.

Чем опасна слабость задних конечностей

Да, это нередко сигнал об угрозе жизни: тромбоз, значительная травма, отравление. Необходима срочная ветеринарная помощь.

Допустимо ли самостоятельно дать обезболивающее

Нельзя давать анальгетики и прочие лекарства без рекомендации врача. Некоторые препараты токсичны для кошек, а обезболивание может скрыть важные симптомы. Дождитесь рекомендаций ветеринара.

Когда вызывать врача при слабости задних лап

Обратиться нужно без промедления, особенно если признак возник остро. Если возможны травма, закупорка сосуда или отравление, время измеряется часами. Не стоит ждать самостоятельного улучшения.

Каков прогноз при слабости задних конечностей

Прогноз зависит от причины, своевременности помощи и общего состояния питомца. При раннем обращении шансы на восстановление выше. Некоторые кошки нуждаются в длительной реабилитации.